

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian perbedaan tingkat defisit neurologis antara stroke iskemik lesi hemisfer kiri dan kanan di RSUD Dr. Moewardi, dapat disimpulkan bahwa :

1. Terdapat perbedaan tingkat defisit neurologis antara stroke iskemik lesi hemisfer kiri dan kanan di RSUD Dr. Moewardi.
2. Nilai $p=0,001$ dengan rerata NIHSS Stroke iskemik lesi hemisfer kiri sebesar 11,9655 dengan simpang baku ($\pm 3,417$) dan stroke iskemik lesi hemisfer kanan sebesar 7,9655 dengan simpang baku ($\pm 2,211$).

B. Saran

Berdasarkan atas beberapa kekurangan yang ada pada penelitian ini maka peneliti menyarankan:

1. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut menggunakan metode penelitian yang memiliki tingkatan lebih tinggi seperti *case control* atau kohort.
2. Perlu dilakukan penelitian dengan jumlah sampel yang lebih banyak; kontrol variabel perancu seperti kadar fibrinogen plasma, kadar leukosit, kadar zink dalam darah dan penelitian menggunakan data primer
3. Perlunya mempertimbangkan letak lesi dalam menentukan sikap bagi para penderita maupun keluarga penderita dalam upaya manajemen penatalaksanaan stroke iskemik.
4. Berdasarkan hasil penelitian diatas, maka institusi kesehatan serta pembuat kebijakan perlu mempertimbang letak lesi untuk manajemen penatalaksanaan stroke iskemik supaya mendapatkan hasil maksimal dan sesuai dengan yang kita diharapkan.